



SOPHIAHEMMET SJUKHUS

Öron-näs-halskliniken

Information om operation av tungbandet

VAD ÄR KORT TUNGBAND?

Ett slemhinneveck under tungan som inte har tillbakabil-dats under utvecklingen under fosterstadiet.

VARFÖR OPERERAR MAN TUNGBANDET?

För att förbättra tungans rörlighet vilket leder till:

- Tydligare tal
- Lättare att rengöra tänderna
- Minskad dregling
- Bättre sväljförmåga

FÖRE OPERATIONEN

Man får äta och dricka fram till sex timmar före ope-rationen om operationen görs i narkos. Därefter råder strikt fasta eftersom det kan medföra komplikationer vid sövningen.

OPERATIONEN

Mindre barn sövs vid operationen medan äldre barn och vuxna opereras i lokalbedövning. Operationen tar oftast ca 10 minuter. Tungbandet oftast med 1-3 stygn som fal-ler bort av sig självt efter någon vecka.

EFTER HEMKOMSTEN

Vid smärta ges smärtstillande medicin, tex Alvedon eller motsvarande. Det går bra att äta och dricka samma dag som operationen men undvik sura födoämnen som kan svida. Det kan vara lämpligt att vara hemma från dagis/ skola första dagen efter operationen.

Börja med tunggymnastik redan dagen efter opera-tionen, tex:

- Sträcka ut tungan
- Slicka bort godis från överläppen
- Slicka i sig glasspinnar

KOMPLIKATIONSRISKER

Det är ovanligt med komplikationer. Om barnet får hög feber kan infektion ha tillstött. Kontakta då din behand-lande läkare.

OM DU FÅR BESVÄR EFTER OPERATIONEN:

Ring mottagningen:

08-406 28 11

