



SOPHIAHEMMET SJUKHUS

# Öron-näs-halskliniken

## Operation av utåtstående öron

### NÄR OPERERAS UTSTÅENDE ÖRON?

Om öronen är utstående och barnet själv uttrycker en önskan om korrigerande finns möjlighet till operation. Många barn har utstående öron utan att besväras av dem och i sådana fall finns ingen anledning till att operera öronen.

### FÖRE OPERATIONEN

Man får inte äta eller dricka någonting 6 timmar före operationen om operationen görs i narkos. Veckan före operationen bör man inte inta mediciner som innehåller acetylsalicylsyra eller annan medicin eller naturläkemedel (t ex Omega 3) som kan ha blodförtunnande effekt. Var noga med att tvätta håret, öronen, halsen och ansiktet före operationen hemma med vanligt schampo och tvål.

### OPERATIONEN

Operationen planeras individuellt efter hur öronen ser ut. Operationen tar ca en timme och sker vanligen under narkos. Man kan även göra ingreppet i lokalbedövning om barnet är lite äldre. Brosket i öronen korrigeras via små snitt som inte brukar synas. Såren sys med tråd som löser upp sig av sig självt. När operationen avslutas får man ett stort bandage runt huvudet som skall sitta i en vecka.

### EFTER OPERATIONEN

Efter operationen övervakas barnet på uppvakningsavdelningen innan hemgång om barnet varit sövt. Det kan spänna i öronen efter operationen, och första dygnet gör det ofta ont och man kan behöva ta smärtstillande. Bandaget avlägsnas på Öron-näs-halskliniken vid Sophiahemmet ca en vecka efter operationen. Räkna med barnet är borta från skolan i 7 dagar.

### KOMPLIKATIONER

I mycket sällsynta fall uppstår sårinfektion. Om barnet känner ökad smärta, en bultande värk och har feber över 38° kontakta Öron-, näs- och halskliniken eller din läkare. Barnet kan då behöva antibiotikabehandling. Vid infektion finns risk att det kosmetiska resultatet inte blir som önskat.

### OM DITT BARN FÅR BESVÄR

#### EFTER OPERATIONEN:

Ring mottagningen:

08-406 28 11

