



Öron-näs-halskliniken

Operation av uttåstående öron

När opereras uttåstående öron?

Om öronen är uttåstående och man själv uttrycker en önskan om korrigerande finns möjlighet till operation. Många har uttåstående öron utan att besväras av dem och i sådana fall finns ingen anledning till att operera öronen.

Före operationen

Man får inte äta någonting 6 timmar före operationen om operationen görs i narkos, vg se separat info.

Om operationen görs i lokalbedövning, förbereds öronen med EMLA-salva, som köpes receptfritt på apoteket. Salvan påstrykes **tjockt** på både fram- och baksidan av öronen 2h, innan operationstiden. Täck öronen med plastfolie och sedan en mössa.

Veckan före operationen bör man inte inta mediciner som innehåller acetylsalicylsyra eller annan medicin eller naturläkemedel (t ex Omega 3) som kan ha blodförtunnande effekt.

Var noga med att tvätta håret, öronen, halsen och ansiktet före operationen hemma med vanligt schampo och tvål. Vid långt hår, sätt upp håret i en stram hög tofs för att få undan det från området kring öronen!

Operationen

Operationen planeras individuellt efter hur öronen ser ut. Operationen tar ca en timme och sker hos de flesta barn under narkos. Man kan även göra ingreppet i lokalbedövning om man är lite äldre. Brosket i öronen korrigeras via små snitt som inte brukar synas. Såren

sys med tråd som löser upp sig av sig självt. När operationen avslutas får man ett stort förband runt huvudet som skall sitta kvar i en vecka.

Efter operationen

Efter operationen övervakas barnet på uppvakningsavdelningen innan hemgång om det varit sövt. Om man gjort operationen i lokalbedövning får man gå direkt hem efter operationen.

Det kan spänna i öronen efter operationen, och första dygnet gör det ofta ont och man kan behöva ta smärtstillande.

Räkna med att vara borta från skola/arbete i 7 dagar, dvs så länge förbandet sitter kvar. Man kan inte blöta huvudet ellersporta första veckan pga förbandet.

Förbandet avlägsnas på ÖNH-mottagningen ca en vecka efter operationen. Därefter ska man sova med pannband i 3 veckor. Köp ett tunt brett trikåpannband på sportbutik!

Slutkontroll av resultatet sker efter 6 månader på ÖNH-mottagningen.



Komplikationer

I mycket sällsynta fall uppstår sårinfektion. Om du känner ökad smärta, en bultande värk och feber över 38° kontakta Öron-, näs- och halsmottagningen eller din läkare. Du kan då behöva antibiotikabehandling. Vid infektion finns risk att det kosmetiska resultatet inte blir som önskat. Man kan aldrig garantera att öronen blir helt symmetriska och ärrer kan i sällsynta fall bli misspyrdande.

En annan ovanlig komplikation är nedsatt känsel i örat.

Öron-Näs-Halskliniken

Sophiahemmet, Hus K, Entréplan, Valhallavägen 91, 11486 Stockholm

Tel: 08-120 713 00 Fax: 08-120 713 39

www.öronkliniken.se